

أخطر أنواع الفطر السام في السويد!

- لا تختبر فطر يشبه الأنواع الواردة في هذا الكتيب!
- لا تختبر سوى الأنواع التي تعرفها جيداً!
- لا تذوقها! فحتى الأنواع السامة من الفطر لذيدة المذاق!
- دع مهمة تنظيف الفطر للأشخاص البالغين ممن هم على دراية بكيفية التعامل معه!
- احرص على اقتناء كتاب حديث يتناول أنواع الفطر!



عش الغراب الذبابة

Amanita muscaria

يتراوح قطر القبعة بين ١٠ و ٢٥ سم، كما يتراوح لونها من الأحمر الزاهي إلى الأحمر الباهت الضارب إلى البرتقالي. أما البقع، فلونها أبيض. ويوجد بالساق حلقة كبيرة والجزء السفلي منها يبدو منتفخاً. ينمو هذا الفطر في الغابات الموسمية والصنوبرية.



لهذه الأنواع الثلاثة قبعات عليها بقع. ولكن عدد هذه البقع يمكن أن يتناقص حتى لا يتبقى منها إلا القليل أو لا يتبقى أي بقع على الإطلاق.

عش الغراب الذبابة البنية

Amanita muscaria var. regalis

قطر القبعة التي يتراوح لونها بين البني والبني الضارب إلى الصفرة، ما بين ١٠ و ٢٠ سم، كما يوجد بها بقع بيضاء مائلة إلى الصفرة. ويوجد بالساق حلقة بارزة والجزء السفلي منها يبدو منتفخاً. وينمو هذا الفطر في الغابات الصنوبرية.



عش الغراب النمر

Amanita phantherina

يتراوح قطر القبعة بين ٥ و ١٢ سم، ويوجد بها ظلال بنية اللون. تتميز البقع باللون الأبيض، ولا تظهر أحياناً حلقة في الساق. والجزء السفلي من الساق يبدو منتفخاً. ينمو هذا الفطر في الحدائق والغابات الموسمية، وأحياناً أيضاً في الغابات الصنوبرية.



الأثار والأعراض الناجمة عن السم

تحتوي جميع هذه الفطريات على سموم تصيب الجهاز العصبي بالخلل. كما يمكن أن تسبب الشعور بالدوار والتشوش، والتوتر، وانخفاض مستوى الوعي، والتشنجات. كما قد ينجم عنها أحياناً الشعور بالغثيان والقيء.

كيف يمكنك معرفة المزيد عن الفطر؟

- يمكنك الالتحاق بإحدى الدورات أو الرحلات التعليمية التي تتناول الفطر. حيث تحرص المؤسسات التعليمية والجمعيات المعنية بالفطر على عقد دورات ورحلات تعليمية حول هذا الموضوع.

• مواقع إلكترونية مفيدة: www.svampkonsulent.se www.svampquiden.com

اتصل برقم ١١٢ (خدمة متاحة على مدار ٢٤ ساعة في اليوم) في حالات التسمم الطارئة واطلب معلومات متعلقة بالتسمم. اتصل برقم ٤٥٦٦٧٠٠ - ٠١٠ في الحالات الأقل خطورة.

www.gic.se

فطر الملوك القاتل

Amanita virosa

هذا الفطر يكسوه اللون الأبيض بالكامل. يتراوح قطر القبعة بين ٥ و ١٢ سم. وعادةً ما يوجد بالساق حلقة، ولكنها قد تختفي أحياناً. وعندما تكون هذه الفطريات صغيرة تكون شبيهة بالبيض. والجزء السفلي من الساق، الذي عادة ما يكون مغروساً وسط الطحالب، يبدو منتفخاً. ينمو فطر الملوك القاتل في غابات الصنوبر المكسوة بالطحالب وغابات خشب الزان

الآثار والأعراض الناجمة عن السم

يعمل السم على إتلاف الكبد. ومن أعراضه الإسهال المائي، والشعور بالغثيان، والقيء الذي يبدأ بعد عدة ساعات من تناول الفطر. ويمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالكبد. قد تؤدي حالة التسمم إلى الوفاة



فطر قبعة الموت

Amanita phalloides

يتراوح قطر القبعة بين ٥ و ١٢ سم. ويختلف لونها اختلافاً كبيراً، حيث يتراوح من الأبيض الكامل تقريباً إلى الأخضر أو الرمادي كما تحتوي على ظلال لونها بني فاتح. أما الخياشيم، فلونها أبيض. ويوجد بالساق أحياناً - وليس دائماً - حلقة رقيقة. والجزء السفلي من الساق يبدو منتفخاً. ينمو فطر قبعة الموت في الغابات الموسمية والغابات المختلطة (الأشجار الموسمية والصنوبرية التي تنمو معاً) وفي المروج التي تحتوي على شجر الزان، والبلوط، والبنديق.

الآثار والأعراض الناجمة عن السم

يحتوي على نفس السم الذي يحتوي عليه فطر الملوك القاتل. يسبب نفس الأعراض وله تأثير قاتل مماثل - انظر أعلاه!



فطر ويبكاب القاتل

Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

يتراوح قطر القبعة بين ٤ و ٨ سم. ويتراوح لون الفطر بالكامل بين البني الضارب إلى الحمرة والبني الضارب إلى الصفرة. القبعة مخروطية الشكل، ولكن ليس دائماً. ينمو هذا الفطر في غابات الصنوبر المكسوة بالطحالب وغابات خشب الزان. يُعتبر فطر ويبكاب الخادع (سي أوريلانوس) نوعاً مشابهاً لفطر ويبكاب القاتل، ويحتوي على نفس السم. ينمو هذا الفطر في الغابات الموسمية التي تحتوي على شجر الزان، والبلوط، والبنديق.

الآثار والأعراض الناجمة عن السم

يسبب هذا السم تلفاً بالكليتين، وقد يؤدي إلى تدميرهما بالكامل. لا تظهر علامات التسمم إلا بعد مرور عدة أيام على تناول الفطر. ومن أعراضه الشعور بالعطش، ووجع في العضلات، وزيادة كميات البول أو قلتها. قد تؤدي الإصابة بالتسمم إلى اللجوء إلى العلاج بالغسيل الكلوي لمدة طويلة، أو حتى أحياناً زرع كلي.




الفطر الزائف

Gyromitra esculenta

ينتمي الفطر الزائف إلى فصيلة مختلفة تماماً من الفطريات. يتراوح قطر القبعة بين ٤ و ١٢ سم، ولونها بني وتشبه في شكلها شكل مخ الإنسان. يختلف لون الساق، وتحتوي على ظلال ذات لون رمادي فاتح، أو بني، أو بنفسجي باهت. ينمو الفطر الزائف في الربيع ابتداءً من شهر أبريل وحتى تورق أشجار القضبان، ويكون ذلك عادةً بمحاذاة طرق الغابات بالقرب من الجذوع المستأصلة أو في الأراضي التي تم قطع الأشجار بها.

الآثار والأعراض الناجمة عن السم

يصيب هذا السم الجهاز العصبي بالخلل، وقد يؤدي أيضاً إلى تلف خلايا الدم والكبد. ومن أعراضه الشعور بالدوار، وازدواج الرؤية، وصعوبة الكلام. ومن الأعراض الأخرى المحتمل ظهورها الشعور بالغثيان والآلام بالمعدة.



Giftinformationscentralen
SWEDISH POISONS INFORMATION CENTRE