

# Najopasnije otrovne gljive u Švedskoj!



- Nemojte brati gljive koje su slične onima u brošuri!
- Berite jedino gljive koje sigurno prepoznajete!
- Nemojte isprobavati! I otrovna gljiva zna biti ukusna!
- Dopustite jedino odraslim znalcima gljiva da ih čiste!
- Nabavite modernu knjigu o gljivama!



## Muhara

*Amanita muscaria*

Klobuk 10–25 cm. Boja klobuka može varirati od žarko crvene do blijede narančasto crvene boje. Točke su bijele. Stručak ima debeli prsten i donji dio stručka je proširen. Raste u listopadnim i crnogoričnim šumama.



## Smeđa muhara

*Amanita muscaria var. regalis*

Klobuk smeđe do žuto smeđe boje je 10–20 cm i ima bijelo žute točke. Stručak ima vidljiv prsten i donji dio stručka je proširen. Raste u crnogoričnim šumama.



## Panterova muhara

*Amanita pantherina*

Klobuk je 5–12 cm i različitih je nijansa smeđe boje. Točke su bijele, prsten oko stručka zna ponekad nedostajati. Donji dio stručka je proširen. Obično raste u listopadnim šumama i parkovima, ali zna se naći i u crnogoričnim šumama.

Ove tri vrste imaju klobuke sa točkama. Ali točke lako otpadnu i znaju potpuno ili dijelom nedostajati.

### Djelovanje i simptomi otrova

Sve ove gljive sadrže otrove koji štete živčanom sistemu. Zna doći do vrtoglavice, zbunjenosti, osjećaja nemira, smanjene svijesti i grčeva. Ponekad i do osjećaja mučnine i povraćanja.

### Kako Vi možete naučiti više o gljivama?

- Pokušajte se pridružiti tečaju o gljivama ili gljivarskom izletu. Postoje i obrazovni savezi (pučka učilišta) i udruženja koja organiziraju takve.
- Dobre web stranice: [www.svampkonsulent.se](http://www.svampkonsulent.se) • [www.svampguiden.com](http://www.svampguiden.com)

**112** Nazovite 112 u slučaju dogođenog trovanja i zatražite non-stop uslugu za informacije o trovanju. Nazovite 010-456 6700 u manje hitnim situacijama • [www.gic.se](http://www.gic.se)



## Smrdljiva pupavka

*Amanita virosa*

Cijela gljiva je bijele boje. Klobuk 5-12 cm. Na stručku je prsten, ponekad može prsten nedostajati. Kada su gljive jako mlade izgledaju kao jaje. Donji dio stručka, koji se često nalazi duboko u mahovini, je proširen, nabreknut. Smrdljiva pupavka raste u crnogoričnim šumama gdje ima mahovine i u bukovim šumama.

### Djelovanje i simptomi otrova

Otrov šteti jetri. Znakovi trovanja su vodeni proljevi, osjećaj mučnine i povraćanje koje počinje satima nakon gljivskog obroka. Opasnost ozbiljnog oštećenja jetre je velika. Trovanje može dovesti do smrti.



## Zelena pupavka

*Amanita phalloides*

Klobuk 5-12 cm. Boja klobuka zna dosta varirati, od skoro sasvim bijele boje do zelenih ili sivih i svijetlo smeđih nijansa. Listići su bijeli. Stručak ima tanak prsten, koji ponekad nedostaje. Donji dio stručka je proširen, nabreknut. Zelena pupavka raste u listopadnim i mješovitim šumama (listopadna i crnogorična stabla rastu zajedno) i na livadnim poljima gdje bukve, hrastovi i ljeske rastu.

### Djelovanje i simptomi otrova

Sadrži isti otrov kao smrdljiva pupavka. Daje iste simptome i jednako je opasna – vidite gornji tekst!



## Šiljasta koprenka!

*Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)*

Klobuk 4-8 cm. Cijela gljiva je crveno smeđe do žuto smeđe boje. Klobuk je često stožastog izgleda, ali ne uvijek. Raste u crnogoričnim šumama gdje ima mahovine i u bukovim šumama. Vrlo slična vrsta koja sadrži isti otrov je narančasto smeđa koprenka ((crvenjača) *C.orellanus*). Raste u listopadnim šumama gdje hrastovi, bukve i ljeske rastu.

### Djelovanje i simptomi otrova

Otrov šteti bubrezima, koji mogu postati potpuno upropašteni. Znakovi trovanja pojavljuju se tek nakon nekoliko dana. Ovi mogu dati pojačanu žeđ, bol u mišićima, pojačane ili smanjene količine mokraće. Čovjek koji se otrovao može biti primoran dugotrajnom liječenju dijalizom i možda presađivanju bubrega.



## Rani hrčak

*Gyromitra esculenta*

Rani hrčak pripada sasvim drugoj vrsti gljiva. Klobuk je 4-12 cm, smeđe boje, zaobljen i plisiran. Boje stručka znaju varirati, u svijetlo sivim, smeđim ili blago ljubičastim nijansama. Rani hrčak raste u proljeće od aprila sve do cvjetanja breze, često uz šumske puteve, prevrnutih korijena ili u iskrčene šume.

### Djelovanje i simptomi otrova

Otrov šteti živčanom sistemu i isto tako može biti štetan krvnim zncima i jetri. Znakovi trovanja su vrtoglavica, diplopija i nerazgovijetan govor. Može doći i do osjećaja mučnine i bolova želuca.



**Giftinformationscentralen**

SWEDISH POISONS INFORMATION CENTRE