

این سه گونه دارای کلاهک‌های خالدار می‌باشند. اما این خال‌ها بر راحتی می‌توانند جدا شوند و یا قارچ کاملا یا تا حدی فاقد آنها باشد.

آمانیتا موسکاریا (قارچ مگس)

Amanita muscaria

کلاهک ۱۰ تا ۲۵ سانتیمتر. رنگ کلاهک می‌تواند از قرمز تند تا نارنجی روشن متغیر باشد. خال‌ها سفیدرنگ هستند. بدنه آنها دارای یک حلقه ضخیم می‌باشد و قسمت پایین بدنه متورم است. در جنگل‌های درختان برگ‌دار و جنگل‌های درختان دارای برگ‌های سوزنی شکل می‌روید.



آمانیتا رگالیس

Amanita muscaria var. regalis

کلاهک قهوه‌ای تا قهوه‌ای مایل به زرد آن ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر بوده و دارای خال‌های سفید و زرد می‌باشد. بدنه آن یک حلقه آشکار دارد و قسمت پایین بدنه متورم می‌باشد. در جنگل‌های درختان دارای برگ‌های سوزنی شکل می‌روید.



کلاه پلنگی

Amanita phantherina

کلاهک آن ۵ تا ۱۲ سانتیمتر بوده و دارای رنگ‌هایی در طیف‌های قهوه‌ای می‌باشد. خال‌های آن سفید است، در بعضی اوقات فاقد حلقه بر روی بدنه خود می‌باشد. قسمت پایین بدنه آن متورم است. معمولا در جنگل‌های درختان برگ‌دار و پارک‌ها می‌روید اما همچنان در جنگل‌های درختان دارای برگ‌های سوزنی شکل هم می‌روید.



اثر سمی و علائم مسمومیت

همه این قارچ‌ها دارای سمی هستند که سیستم عصبی را دچار اختلال می‌کند. سرگیجه، سردرگمی، نگرانی، کاهش سطح آگاهی و تشنج هم ممکن است پیش بیاید. در بعضی اوقات همچنین حالت تهوع و استفراغ.

چگونه مطالب بیشتری پیرامون قارچ‌ها بیاموزید؟

- تلاش کنید به یک دوره آموزشی قارچ و یا یک پیکنیک جنگلی بروید.
- اتحادیه‌های آموزشی و انجمن‌هایی وجود دارند که این فعالیت‌ها را برگزار می‌کنند.

www.svampkonsulent.se

های مناسب‌وبسایت:

www.svampguiden.com

خطرناکترین قارچ‌های سمی در سوئد!



توقف!

- قارچ‌هایی که شبیه قارچ‌ها در این بروشور هستند را نچینید!
- فقط قارچ‌هایی که با قطعیت می‌شناسید را بچینید!
- برای امتحان قارچ را نچشید! حتی قارچ‌های سمی هم ممکن است خوش طعم باشند!
- تنها اجازه دهید یک بزرگسال که قارچ‌شناس می‌باشد قارچ‌ها را تمیز کند!
- یک کتاب قارچ‌شناسی مدرن تهیه نمایید!

اگر سائحه مسمومیت پیش آمد به ۱۱۲ زنگ زده و درخواست اطلاعات در مورد قارچ‌ها نمایید. در تمام طول شبانه روز. درموردی که کمتر اضطراری است به این شماره زنگ بزنید:

010-456 6700

www.gic.se



الصور والتخطيط: سیکال کریکوریف

Svampkonsulenternas Riksförbund

این بروشور از سوی مرکز اطلاعات مسمومیت‌ها و اتحادیه سراسری مشاوران قارچ‌شناس تهیه شده است.



کور تیناریوس روبلوس

Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

کلاهک ۴ تا ۸ سانتیمتر. تمام این قارچ قرمز مایل به قهوه‌ای تا زرد مایل به قهوه‌ای است. کلاهک آن اغلب نوک تیز است، اما همیشه اینطور نیست. در جنگل‌های درختان دارای برگ‌های سوزنی شکل و جنگل‌های درختان راش می‌روید. یک گونه مشابه آن که حاوی همان سم می‌باشد کور تیناریوس اورلانوس (*C. orellanus*) می‌باشد. این قارچ در جنگل‌های درختان برگ‌دار مانند بلوط، راش و فندق می‌روید.

اثر سمی و علائم مسمومیت

این سم به کلیه‌ها آسیب می‌زند بگونه‌ای که ممکن است آنها کاملاً از بین بروند. علائم مسمومیت بیش از سیری شدن چند روز خود را نشان نمی‌دهند. این علائم می‌تواند

حالت تهوع، استفراغ، افزایش حالت تشنگی، درد ماهیچه‌ها، ادرار، باشد. فرد مسموم ممکن است نیازمند دیالیز خون برای منتهی طولانی و شاید بیوند کلیه باشد.



فرشته تباهی

Amanita virosa

کل این قارچ سفیدرنگ است. کلاهک آن ۵ تا ۱۲ سانتیمتر است. بر روی بدنه آن یک حلقه وجود دارد، بعضی اوقات این حلقه وجود ندارد. هنگامی که قارچ‌های قاتل خیلی جوان هستند شبیه یک تخم مرغ می‌باشند. قسمت پایین بدنه قارچ، که در بیشتر اوقات در عمق خاک مرطوب جنگلی قرار گرفته، متورم است. فرشته تباهی در جنگل‌های مرطوب درختان دارای برگ‌های سوزنی و درختان راش می‌روید.

اثر سمی و علائم مسمومیت

این سم به کبد آسیب می‌زند. علامت مسمومیت اسهال آبیکی، حالت تهوع و استفراغ‌هایی است که ساعت‌های بسیاری پس از خوردن وعده غذایی با این قارچ، اتفاق می‌افتد. خطر آسیب جدی کبد بالاست. این مسمومیت می‌تواند موجب مرگ شود.



قارچ مورل قلبی (قارچ مغز)

Gyromitra esculenta

قارچ مورل قلبی متعلق به یک گروه دیگر از قارچ‌ها می‌باشد. کلاهک آن ۴ تا ۱۲ سانتیمتر، قهوه‌ای، گرد و چین‌دار است. بدنه آن می‌تواند

اند رنگ‌های متفاوتی داشته باشد، خاکستری روشن، قهوه‌ای و یا در طیف‌های بنفش کمرنگ. قارچ مورل قلبی در بهار

از ماه آوریل تا زمان جوانه‌زدن سبیدارها، اغلب در اطراف راه‌های جنگلی، در محل خارج کردن

ریشه‌ها و یا محلی در جنگل که درختان آن بریده شده‌اند، می‌روید.

اثر سمی و علائم مسمومیت

این سم سیستم عصبی را دچار اختلال می‌کند و همچنین

می‌تواند به گلوبول‌ها و کبد آسیب وارد کند. علائم مسمومیت

سرگیجه، دو بینی (دید دوگانه) و لکنت زبان باشد. حالت تهوع

درد شکم هم ممکن است دیده شود.



کلاهک مرگ (آمانیتا فالوئیدس)

Amanita phalloides

کلاهک آن ۵ تا ۱۲ سانتیمتر است. رنگ کلاهک می‌تواند بسیار متغیر باشد، از سفید یکدست گرفته تا سبزرنگ یا طیف‌های خاکستری و قهوه‌ای روشن. صفحات آن سفیدرنگ می‌باشد.

بدنه آن یک حلقه نازک دارد، اما بعضی اوقات فاقد آن می‌باشد. قسمت پایین بدنه آن متورم است. کلاهک مرگ در

جنگل‌های درختان برگ‌دار، جنگل‌های مختلط (مکانی که درختان برگ‌دار و درختان دارای برگ‌های سوزنی

شکل در کنار هم می‌رویند)، و در مرغزارهای دارای درختان راش، بلوط و فندق می‌روید.

اثر سمی و علائم مسمومیت

دارای همان سمی می‌باشد که فرشته تباهی حاوی آن است. همان علائم مسمومیت را نشان می‌دهد و بهمان اندازه خطرناک است - به مطلب

بالا مراجعه کنید!

