

Ruotsin vaarallisimmat myrkkysienet!



- Älä kerää sieniä, jotka muistuttavat tässä esitteessä esiteltyjä lajeja!
- Kerää vain varmasti tuntemiasi sieniä!
- Älä maista! Myrkyllinenkin sieni voi maistua hyvältä!
- Sienten perkaaminen kuuluu sieniä tuntevalle aikuiselle!
- Hanki ajantasainen sienikirja!



Punakärpässieni

Amanita muscaria

Lakki 10–25 cm. Lakin väri vaihtelee voimakkaan punaisesta vaaleaan oranssinpunaiseen. Täplät ovat valkoisia. Jalassa on selkeä rengas, ja jalan alaosa on pullistunut (tuppi). Kasvaa lehti- ja havumetsässä.



Ruskokärpässieni

Amanita muscaria var. regalis

Halkaisijaltaan 10–20 cm:n kokoinen lakin väri vaihtelee ruskeasta kellanruskeaan, ja täplät ovat kellertäviä. Jalassa on selkeästi erottuva rengas, ja jalan alaosa on pullistunut (tuppi). Kasvaa havumetsässä.



Panterikärpässieni

Amanita pantherina

Halkaisijaltaan 5–12 cm:n kokoinen lakki on ruskeansävyinen. Täplät ovat valkoisia, jalassa rengas, voi joskus puuttua. Jalan alaosa on pullistunut (tuppi). Kasvaa tavallisesti lehtimetsässä ja puistoissa mutta joskus myös havumetsässä.

Näiden kolmen lajin lakit ovat valkotäpläiset. Täplät irtoavat helposti tai saattavat puuttua kokonaan tai osittain.

Myrkytysvaikutus ja oireet

Kaikki nämä sienet sisältävät hermostoon vaikuttavaa myrkyä. Mahdollisia oireita ovat mm. huimaus, sekavuus, levottomuus, tajunnan heikkeneminen ja kouristukset sekä joskus myös pahoinvointi ja oksennukset.

Miten opit tuntemaan sienet paremmin?

- Osallistu sienikursseille tai -retkelle, joita järjestävät mm. kansalaisopistot ja yhdistykset.
- Hyviä sivustoja: www.svampkonsulent.se • www.svampguiden.com

112

Soita myrkytystapauksessa numeroon 112 ja pyydä yhdistämään Myrkytyskeskukseen (Giftinformationscentralen) – ympäri vuorokauden. Jos tapaus ei ole kiireellinen, soita numeroon 010-456 6700 • www.gic.se



Valkokärpässieni

Amanita virosa

Kauttaaltaan valkoisen sienen lakki on halkaisijaltaan 5–12 cm. Jalassa on rengas, mutta joskus se saattaa myös puuttua. Aivan nuoret kärpässienet muistuttavat ulkonäöltään kananmunaa. Usein hyvinkin syvällä sammaleen sisällä kasvava jalka on alaosastaan pullistunut (tuppi). Valkoinen kärpässieni kasvaa sammaleisessa havumetsässä ja pyökkimetsässä.

Myrkytysvaikutus ja oireet

Myrkytysvaikutusta ei ole. Myrkytyksen oireita ovat vesimäinen ripuli, pahoinvointi ja oksennukset, jotka alkavat useita tunteja sieniaterian jälkeen. Maksa voi vahingoittua vakavasti, ja myrkytys voi johtaa kuolemaan.



Kavalakärpässieni

Amanita phalloides

Lakki 5–12 cm. Lakin väri saattaa vaihdella jonkin verran melkein täysin valkoisesta vihertävään tai harmaan ja vaaleanruskean sävyihin. Heltat ovat valkoiset. Jalassa on ohut rengas, joka kuitenkin joskus puuttuu. Jalan alaosa on pullistunut (tuppi). Kavalakärpässieni kasvaa lehtimetsässä, sekametsässä (jossa kasvaa sekä lehti- että havupuuta) ja niityillä, joissa kasvaa pyökejä, tammia ja pähkinäpuita.

Myrkytysvaikutus ja oireet

Sisältää samaa myrkyä kuin valkokärpässieni. Aiheuttaa samoja oireita ja on yhtä vaarallinen – katso yllä!



Suippumyrkkyseitikki

Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

Lakki 4–8 cm. Koko sienen väri vaihtelee punaruskeasta kellanruskeaan. Lakki on usein suippo, mutta ei aina. Kasvaa sammaleisessa havumetsässä ja pyökkimetsässä. Suippumyrkkyseitikkiä muistuttava oranssinruskea lehtomyrkkyseitikki (*C. orellanus*) sisältää samaa myrkyä. Se kasvaa lehtimetsässä, jossa on tammia, pyökkiä ja pähkinäpensaita.

Myrkytysvaikutus ja oireet

Myrkytysvaikutusta ei ole. Myrkytysvaikutusta ei ole. Myrkytysvaikutus ilmenevät vasta useiden päivien kuluttua. Oireita ovat esimerkiksi lisääntynyt jano, lihaskipu sekä lisääntynyt tai vähentynyt virtsanmäärä. Myrkytyksen saanut henkilö saattaa tarvita dialyysihoidon pitkän aikaa ja ehkä jopa munuaissiirron.



Korvasieni

Gyromitra esculenta

Korvasieni kuuluu aivan eri sieniryhmään. Halkaisijaltaan 4–12 cm:n kokoinen lakki on ruskea, pyöreähkö ja poimuinen. Jalan väri vaihtelee vaaleanharmaasta ruskeaan tai hennon violettiin sävyihin. Korvasieni kasvaa keväällä huhtikuusta koivunlehtien puhkeamiseen asti metsäteiden varsilla, juurakoiden vierustoilla ja hakkuualueilla.

Myrkytysvaikutus ja oireet

Myrkytysvaikutusta ei ole. Myrkytysvaikutusta ei ole. Myrkytysvaikutus ilmenevät vasta useiden päivien kuluttua. Oireita ovat huimaus, kahtena näkeminen ja sammaltava puhe. Myös pahoinvointia ja vatsakipua voi esiintyä.



Giftinformationscentralen

SWEDISH POISONS INFORMATION CENTRE