

瑞典 最毒的蘑菇!



- 不可采摘任何一个类似这本小册子里的蘑菇!
- 只可采摘您熟悉的蘑菇!
- 千万不可尝试!有毒蘑菇也很好吃!
- 让对蘑菇熟悉的成年人清洗这些蘑菇!
- 自备一本讲解现代蘑菇的书!



毒蝇伞 (Röd flugsvamp)

Amanita muscaria

蘑菇伞直径为 10-25 厘米。蘑菇伞的颜色各不相同, 从鲜红色以至浅橙红色。蘑菇伞上有白色斑点。茎部有一个大环, 茎的底部比较肥大。生长在阔叶树林或针叶树林地。



褐色毒蝇伞 (Brun flugsvamp)

Amanita muscaria var. regalis

褐色至黄褐色蘑菇伞的直径是 10-20 厘米, 并有发黄的白色斑点。茎部有一个独特环状, 茎的底部比较肥大。生长在针叶树林地。



豹斑毒伞 (Panterflugsvamp)

Amanita pantherina

蘑菇伞的直径为 5-12 厘米, 并有细微的褐色差别。蘑菇伞上有白色斑点, 茎部并不一定常有环状, 茎的底部比较肥大。生长在阔叶树林地和公园, 有时也生长在针叶树林地。

这三品种的蘑菇伞均有斑点。但是这些斑点很容易脱落至剩下一些或完全脱落。

中毒的影响和症状

所有这些蘑菇都含有可扰乱神经系统的有毒物质。可能会出现头晕、精神错乱、焦虑、意识水平下降和痉挛。有时候也会造成恶心和呕吐。

如何获取更多关于蘑菇的信息?

- 参加蘑菇课程或学习旅行。教育机构和蘑菇学会有提供课程和学习旅行。
- 实用网站: www.svampkonsulent.se • www.svampguiden.com

112 如果发生紧急中毒事件, 致电112 (24小时服务), 并咨询中毒信息中心。
如果情况不太紧急, 致电 010-456 6700。 www.gic.se



毁灭天使 (Vit flugsvamp)

Amanita virosa

整个蘑菇是白色的。蘑菇伞直径为 5-12 厘米。茎部通常会有环状，但有时候没有。当它们还小时，样子看似鸡蛋。茎的底部（通常位于青苔深处）比较肥大。毁灭天使 (*Vit flugsvamp*) 生长在长满青苔的松树林和山毛榉树林。

中毒的影响和症状

中毒会损害肝脏。症状包括水样腹泻、恶心和呕吐，吃蘑菇后的数小时后才开始出现症状。会导致严重肝脏损害。中毒可能导致死亡。



死亡帽 (Lömsk flugsvamp)

Amanita phalloides

蘑菇伞直径为 5-12 厘米。蘑菇伞颜色的变化很大，从几乎全白到绿色或灰色，以及淡褐色。菌褶为白色。茎部有薄环，但并非总是如此。茎的底部肥大。死亡帽 (*Lömsk flugsvamp*) 生长在阔叶树林地、混合树林地（阔叶和针叶树一起成长地），桦木、橡木和榛树生长的草地上。

中毒的影响和症状

与毁灭天使 (*Vit flugsvamp*) 含有相同的毒素。症状也相似，并且同样是致命的 – 见上述！



剧毒伞 (Toppig giftspindling)

Cortinarius rubellus (*C. speciosissimus*)

蘑菇伞直径为 4-8 厘米。整个蘑菇是红褐色至淡黄褐色。蘑菇伞通常成锥形，但并非总是如此。生长在长满青苔的松树林和山毛榉树林。傻瓜伞 (*Orangebrun giftspindling, C. orellanus*) 为类似的品种，并含有相同的毒素。生长在包括桦木、橡木和榛树的阔叶树林地。

中毒的影响和症状

中毒会损害肾脏，并且可能使肾脏完全损坏。中毒症状不会马上出现，但会在吃蘑菇后的数天后产生症状。症状包括口渴、肌肉酸痛、增加或减少排尿。中毒可能会导致长期的洗肾治疗，在某些情况下甚至需要移植肾脏。



假羊肚菌 (Stenmurkla)

Gyromitra esculenta

假羊肚菌属于一个完全不同的蘑菇品种。蘑菇伞直径为 4-12 厘米，颜色为褐色和大脑形状。茎部的颜色各有不同，例如浅灰色、褐色或淡紫色。假羊肚菌生长在春天，从四月直到桦树长新叶，通常在沿着林地的道路旁，靠近连根拔起的树桩或砍伐空地。

中毒的影响和症状

中毒会扰乱神经系统，也会破坏血细胞和肝。症状包括头晕、复视和言语不清。其他可能的症状包括感觉不适和腹痛。



Giftinformationscentralen

SWEDISH POISONS INFORMATION CENTRE