

دا درې ډوله مرخيري خولی لري چې ټکي پکې وي. خو دا ټکي کولی شي په اسانۍ سره ورکې شي او په بشپړ يا جزوي ډول سره له منځه لاړي شي.

## سور مچي ډوله مرخيري امانيتا موسکريا

خولی يې 10-25 سانتي متره وي. د خولی رنگ کولی شي له روښانه سور څخه تر نارنجي سور پورې توپير ولري. ټکي پکې سپين دي. پښه کې يې قوي حلقه وي او د پښې ښکته برخه يې پرسوب لري. په توپيدونکي او مخروط ځنگلونو کې وده کوي.



## نسواري مچي ډوله مرخيري امانيتا موسکريا وار. ريکالييس

نسواري څخه تر ژير نسواري خولی 10-20 سانتي متره ده او سپيني ژېرېښني نقطې لري. پښه روښانه حلقه لري او د پښې ښکته برخه پرسوبلې وي. په مخروطي ځنگل کې وده کوي.



## د پينتر مچي ډوله مرخيري امانيتا پينترينا

خولی 5-12 سانتي متره ده او په نسواري ډولونو کې راځي. ټکي يې سپين دي، په پښو کې حلقه ځيني وختونه ورکيدای شي. د پښو لاندې برخه يې پرسوبلې وي. معمولاً په شنو ځنگلونو او پارکونو کې وده کوي، مگر ځيني وختونه په مخروطي ځنگلونو کې هم وده کوي.



# په سوېډن کې تر ټولو خطرناک زهرجنه مرخيري!



## ودريوئ!

- هغه مرخيري مه راشکوي چې ددې بروشر له انځورونو سره ورته والی لري!
- هغه مرخيري راواخلي چې تاسې يې په پوره توگه پېژنئ!
- ځکل مه کوئ! ځکه چې زهرجن مرخيري هم ښه وځوند لري!
- د مرخېرو راشکولو لپاره يواځې هغه غټانو ته اجازه ورکړئ چې مرخيري پېژني!
- در مرخېرو يو نوی چاپ شوی کتاب له ځانه سره وساتئ!

د مسموم کيدو پيښې په صورت کې 112 ته زنگ ووهئ او د زهر معلوماتو غوښتنه وکړئ - په ورځ کې 24 ساعته .

په کم بيړني حالاتو کې دې شمېرې ته زنگ ووهئ 010-456 6700

[www.gic.se](http://www.gic.se)



د سروزلت خدمت د پيښو لپاره ليدونکي

## د زهر عمل او نښې نښانې

دا ډول ټول مرخيري زهر لري چې عصبي سيستمگم ډوډوي. دا زهر سرخوړی، گډوډی، بي خوبی، د شعور کموالی او اختلالات منځ ته راوړی شي. ځيني وختونه زړه بدوالی اوکانگي هم راتلی شي..

## تاسو څرنگه کولی شئ چې د مرخيريو په اړه نور نور معلومات ترلاسه کړئ؟

- هڅه وکړئ چې د مرخېرو په معلوماتي کورس يا سفرونو کې برخه واخلي. داسې تعليمي انجمنونه او اتجاديي شتون لري چې دا ډول کورسونه او سفرونه تنظيموي.

• ښې ويبپاڼې: [www.svampkonsulent.se](http://www.svampkonsulent.se)

[www.svampguiden.com](http://www.svampguiden.com)

انځور او ترتيب: مايکل کريکوريف



دا بروشر د زهر معلوماتو مرکز او د مرخېرو مشاورينو ملي اتجاديي لخوا چمتو شوی



## لور زهریزه غڼه

کورټیناریوس روبیلوس (سی. سپیسو سپیسوس)

خولای بی له 4-8 سانتی مترو تر منځ وي.

کل ټول مرخیری سور - نسواری یا خر - نسواری وي. خولای بی ډیری وختونه په نښه کیږي، خو تل نه. په شکلن او وچ ځنگل کې وده کوي. یو ورته (ډول زهر لري د نارنجي - نسواری زهر (C. orellanus) دی. دا د بلوط، بیچ او هزیل سره په شنو ځنگلونو کې وده کوي.

### د زهر و عمل او نښې نښانې

دا ډول زهر پښتورگو ته زیان رسوي، او کولای شي چې په بشپړ ډول بی له مینځه وپسي. د مسموم کیدو نښې څو

ورځې وروسته راڅرگندیږي. دا کیدی شي التهاب، کانګې، د تنډې زیاتوالی، د عضلاتو درد، د ادرار زیاتوالی یا کمښت لامل وگرځي. مسموم شوی کس ممکن د اوږدې مودې لپاره د ډایلیسس درملنې ته اړتیا ولري او ممکن د پښتورگو ټرانسپلانټ ته هم اړتیا ولري.



## سپینه مچی ډوله مرخیری

مانیتا ویروسا

دا ډول ټول مرخیری سپین وي. خولای

بی 5-12 سانتی متره وي. په پښو کې بی ډوهه حلقه شتون لري، ځینې وخت کیدای شي دا یوې هگی وي. د پښې لاندینی برخه بی په په شنه خټه کې پړسوب لري. دا ډول سپینه مچی ډوله مرخیری په شنه خټینه او ساحلي زنگ کې موندل کیږي.

### د زهر و عمل او نښې نښانې

دا ډول زهر ځیگر ته تاوان رسوي. د مسمومیت نښې څه په دې ډول دي د اوبو په څېر اسهالات التهاب او کانګې چې د مرخیری خورولو څخه څو ساعته وروسته پیلېږي. په دې حالت کې د ځیگر د جدي زیان خطر لور دی. دا زهر د مرګ لامل کیدای شي.



## ستینمورکلا

کیرومیټرا ایسکو لینټا

ستینمورکلا د مرخیرو په بشپړ ډول مختلف گروپ

پورې اړه لري. خولای بی 2-4 سانتی متره، نسواری، گرده او پوښل شوي ده. ستینمورکلا په پسرلي

کې د اپریل څخه تر برچ پانو پورې وده کوي، ډیری وختونه د ځنگل سرکونو سره، د رینو کانالونو ته نږدې یا په پاکولو کې موندل کیږي.

### د زهر و عمل او نښې نښانې

دا ډول زهر عصبي سیستم گډوډوي او د وینې حجرو او ځیگر ته هم زیان رسولی شي. د مسمومیت نښې د سر درد، دوه گونی لید او گډې وډې خبرې کول. د مغزو او د معدې درد هم پکې واقع کیدی شي.



## ټگ مچی ډوله مرخیری

امینتا فلوریدیس

ددې ډول مرخیرو اندازه 5-12 سانتی متره وي. د خولای رنگ یو څه توپیر لرلی شي، تقریبا په بشپړه تو

گه له سپین څخه تر شنه یا خر او روښانه نسواری سیوري درلودلی شي. ډیسکونه بی سپین وي. پښه یو نری حلقه لري، چې دا حلقه ځینې وختونه ورکه وي. د پښې لاندینی برخه بی پړسوب لري. ټگ مچی ډوله مر

خیری په توپیدونکو ځنگلونو کې وده کوي، په مخلوط ځنگل کې (توویدونکو او مخروطي ونو سره یوځای وده کوي) او د مچ، بلوط او هزیل سره په واښو کې وده کوي.

### د زهر و عمل او نښې نښانې

ددې مرخیری زهر لکه د سپینه مچی ډوله مرخیرو په څېر دي. همدا نښې بی وي او همدومره خطرناکه دي - پورته معلومات ولولئ

