

خطرناکترین قارچها قارچهای سمی سوئد!

- از چیدن قارچهای شبیه در این بروشور خودداری کنید!
- فقط قارچهایی را که مطمئن هستید می شناسید، بچینید!
- مزه آنها را امتحان نکنید! قارچهای سمی نیز ممکن است مزه خوبی داشته باشند!
- بگذارید فقط فرد بزرگسالی که قارچها را می شناسد آنها را تمیز کند!
- یک کتاب جدید در مورد قارچها تهیه کنید!



مگس قارچ سُرخ

آمانیتا موسکاریا

کلاهک بین ۱۰ تا ۲۵ سانتیمتر. رنگ کلاهک ممکن است از سرخ، نارنجی/قرمز تا قهوه‌ای پُرنرنگ متغیر باشد. نقطه‌ها سفیدرنگ هستند. پایه دارای یک حلقه ضخیم و این قارچ دارای پایه متورم است. در جنگلهای پهن‌برگ و سوزنی‌برگ می‌روید.



مگس قارچ قهوه ای

آمانیتا موسکاریا نوع زگالیس

کلاهک قهوه‌ای تا قهوه‌ای متمایل به زرد آن از ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر و دارای نقطه‌های سفید متمایل به زردرنگ است. پایه این قارچ دارای یک حلقه مشخص و قسمت پایین پایه متورم است. در جنگلهای سوزنی‌برگ می‌روید.



مگس قارچ پَنتَر

آمانیتا پانترا

کلاهک آن ۵ تا ۱۲ سانتیمتر و دارای فام‌های قهوه‌ای است. نقطه‌های آن سفیدرنگ است. حلقه روی پایه ممکن است وجود نداشته باشد. قسمت پایین پایه متورم است. معمولاً در جنگلهای پهن‌برگ، پارک‌ها و در جنگلهای سوزنی‌برگ می‌روید.



اثر و علائم سم

همه این قارچها دارای سم هستند که سلسله اعصاب را مختل می‌کند. سرگیجه، سردرگمی، نگرانی، کاهش هوشیاری و انقباضات عضلانی ممکن است بروز کند. گاهی اوقات حالت تهوع و استفراغ نیز بروز می‌کند.

چگونه مطالب بیشتری در مورد قارچها بیاموزید؟

- سعی کنید در یک دوره آموزشی قارچ یا یک گردش در طبیعت شرکت کنید. هم آموزشگاههای اتحادیه ای و هم انجمنها اینگونه دوره های آموزشی یا گردش در طبیعت را برگزار می کنند.

• صفحات مفید در اینترنت: www.svampguiden.com

www.svampkonsulent.se

در صورت بروز حوادث مسمومیت به 112 تلفن کنید و اطلاعات در مورد مسمومیت دریافت کنید. این شماره شبانه روزی است. در صورت بروز حوادث اضطراری کوچکتر به 010-456 67 00 تلفن کنید.

www.gic.se

مگس قارچ سفید

آمانیتا ویروسا

کلاهک آن از ۵ تا ۱۲ سانتیمتر می باشد. بر روی ساقه آن اغلب یک حلقه وجود دارد و گاهی ممکن است این حلقه وجود نداشته باشد. مگس قارچهای کاملاً جوان شبیه تخم مرغ هستند. قسمت تحتانی پایه قارچ که اغلب در عمق جلبکها قرار دارد متورم است. مگس قارچ سفید در جنگلهای سوزنی برگ و راش جلبکی می روید.

اثر و علائم سم

سم این قارچ به کبد صدمه وارد می کند. علامت مسمومیت اسهالهای آبکی، حالت تهوع و استفراغ است که ساعتها پس از خوردن غذای حاوی قارچ، بروز می کند. خطر صدمات جدی به کبد بسیار زیاد است. مسمومیت ممکن است به مرگ منجر شود.



مگس قارچ استطاری

آمانیتا فالویدز

کلاهک آن از ۵ تا ۱۲ سانتیمتر است. رنگ کلاهک ممکن است از سفید کامل تا سبزه یا خاکستری و قهوه ای فام روشن متغیر باشد. پره های قارچ، سفید رنگ هستند. پایه آن دارای یک حلقه نازک است که گاهی اوقات وجود ندارد. قسمت پایین پایه متورم است. مگس قارچ استطاری در جنگلهای پهن برگ، جنگلهای مختلط (دارای درختهای پهن برگ و سوزنی برگ) و مرغزارهای دارای درختان راش، بلوط و فندق می روید.

اثر و علائم سم

حاوی سم مشابه مگس قارچهای سفید است. دارای علائم بیماری مشابه و بهمان میزان خطرناک است - به مطالب فوق رجوع شود!



کورتیناریوس سمی نوک تیز

سناریوس اسپیسوسیسیموئورتک (ناریوس روبولوسپورتک)

کلاهک آن از ۴ تا ۸ سانتیمتر. قارچ بطور کامل سرخ مایل به قهوه ای تا طلائی مایل به قهوه ای است. کلاهک آن اغلب ولی نه در همه موارد نوک تیز است. در جنگلهای سوزنی برگ و راش جلبکی می روید. یک نوع قارچ مشابه که حاوی همان سم است کورتیناریوس سمی قهوه ای نام دارد (کورتیناریوس اورلانوس). این قارچ در جنگلهای پهن برگی بلوط، راش و فندق می روید.

اثر و علائم سم

سم آن به کلیه ها صدمه وارد می کند و ممکن است آنها را بطور کامل از بین ببرد. علائم مسمومیت چند روز بعد ظاهر می شوند. این علائم ممکن است شامل تشنگی، دردهای عضلانی و کاهش یا افزایش ادرار باشند. فرد مسموم ممکن است برای مدتی طولانی به درمان دیالیز و شاید پیوند کلیه نیاز داشته باشد.



Stenmurkla

گرومیترا اسکولنتا

این قارچ متعلق به یک گروه کاملاً مجزای قارچهاست. اندازه کلاهک آن از ۴ تا ۸ سانتیمتر است. قهوه ای رنگ، دارای انحناء و چیندار است. پایه آن ممکن است به رنگهای گوناگونی از خاکستری روشن، قهوه ای یا فام های ضعیف بنفش باشد. این قارچ در فصل بهار از ماه آوریل تا باز شدن برگهای درخت غوشه، اغلب در امتداد راههای جنگلی، کنار ریشه های معلق درختان یا مناطق قطع درخت می روید.

اثر و علائم سم

سم این قارچ سلسله اعصاب را مختل کرده و همچنین می تواند گلبولهای خون و کبد را صدمه بزند. علائم مسمومیت سرگیجه، دید دوبینی (دیبلوپی) و اختلال تکلم (دیسارتیری) است. حالت تهوع و شکم درد نیز ممکن است بروز کند.



Giftinformationscentralen
SWEDISH POISONS INFORMATION CENTRE