

Cele mai otrăvitoare ciuperci din Suedia!



- Nu culegeți ciuperci care seamănă cu cele din această broșură!
- Culegeți numai ciuperci pe care le recunoașteți!
- Nu le încercați gustul! Chiar și ciupercile otrăvitoare sunt gustoase!
- Lăsați adulții care cunosc ciupercile să le curețe!
- Cumpărați-vă o carte modernă despre ciuperci!



Buretele muștelor

Amanita muscaria

Pălăria are 10-25 cm. Culoarea pălăriei variază de la roșu-cireșiu la roșu-portocaliu pal. Bubițele sunt albe. Tulpina are un inel mare, iar partea inferioară a tulpinii este bombată. Crește în pădurile de foioase și de conifere.



Buretele maro al muștelor

Amanita muscaria var. regalis

Pălăria, de culoare maro până la marogălbui, are 10-20 cm și are bubițe de culoare alb-gălbui. Tulpina are un inel distinct, iar partea inferioară a tulpinii este bombată. Crește în pădurile de conifere.



Buretele pestriț

Amanita pantherina

Pălăria are 5-12 cm și are nuanțe maro. Bubițele sunt albe și nu are mereu un inel pe tulpină. Partea inferioară a tulpinii este bombată. Crește în pădurile de foioase și în parcuri, uneori și în pădurile de conifere.

Aceste trei specii au pălării cu bubițe. Dar bubițele pot cădea ușor, rămânând doar câteva sau niciuna.

Efectele și simptomele otrăvii

Toate aceste ciuperci conțin otrăvuri care distrug sistemul nervos. Pot surveni stări de amețeală, confuzie, anxietate, scăderea conștienței și crampe. Uneori și o stare de rău și vărsături.

Cum aflați mai multe despre ciuperci?

- Înscrieți-vă la un curs sau la o expediție pe tema ciupercilor. Asociațiile educaționale și societățile care se ocupă de ciuperci organizează cursuri și expediții.
- Site-uri Web utile: www.svampkonsulent.se • www.svampguiden.com

112 Sunați de urgență la 112 (serviciu nonstop) în cazul unei otrăviri și cereți informații despre otrăvuri. Sunați la 010-456 6700 în cazuri mai puțin urgente • www.gic.se



Buretele tomnatic

Amanita virosa

Întreaga ciupercă este albă. Pălăria are 5–12 cm. De obicei, tulpina are un inel, dar este posibil și să nu aibă. Când sunt tinere, ciupercile arată ca ouăle. Partea inferioară a tulpinii, care de obicei este băgată adânc în mușchi, este bombată. Buretele tomnatic crește în pădurile de pin și de fag, unde pământul este acoperit de mușchi.

Efectele și simptomele otrăvii

Otrava deteriorează ficatul. Simptomele includ diaree apoasă, stare de rău și vărsături care survin la multe ore după consumul ciupercii. Poate cauza afecțiuni grave ale ficatului. Otrăvirea poate fi fatală.



Buretele viperei

Amanita phalloides

Pălăria are 5–12 cm. Culoarea pălăriei variază foarte mult, de la alb aproape în întregime la verde sau cu nuanțe de gri și maro deschis. Lamelele sunt albe. Tulpina are un inel subțire, dar nu întotdeauna. Partea inferioară a tulpinii este bombată. Buretele viperei crește în pădurile de foioase, în păduri mixte (foioase și conifere care cresc împreună) și în lunci cu fagi, stejari și aluni.

Efectele și simptomele otrăvii

Conține aceeași otravă ca buretele tomnatic. Aceleași simptome și la fel de fatal – vedeți mai sus!



Pălăria ucigașă

Cortinarius rubellus (*C. speciosissimus*)

Pălăria are 4–8 cm. Întreaga ciupercă are culoarea de la maro-roșiatic la maro-gălbui. Pălăria este de obicei conică, dar nu mereu. Crește în pădurile de pin și de fag, unde pământul este acoperit cu mușchi. Cortinara de munte (*C. orellanus*) este o specie asemănătoare care conține aceeași otravă. Aceasta crește în pădurile de foioase cu stejari, fagi și aluni.

Efectele și simptomele otrăvii

Otrava afectează rinichii și poate să-i distrugă complet. Semnele de otrăvire nu apar decât după câteva zile de la consumul ciupercii. Simptomele includ greață, vărsături, sete, dureri musculare, creșterea sau reducerea cantității de urină. Otrăvirea poate duce la necesitatea tratamentului cu dializă pe termen lung și, în anumite cazuri, a transplantului de rinichi.



Zbârciogul gras

Gyromitra esculenta

Zbârciogul gras aparține unui grup de ciuperci complet diferit. Pălăria are 4–12 cm, este maro și are formă de creier. Culoarele tulpinii variază, având nuanțe de cenușiu deschis, maro sau violet pal. Zbârciogul gras crește primăvara, din aprilie, până când înfrunzește mesteacănul, de obicei de-a lungul drumurilor forestiere, lângă buturugi dezrădăcinate sau în zone defrișate.

Efectele și simptomele otrăvii

Otrava distruge sistemul nervos și, de asemenea, poate afecta celulele sanguine și ficatul. Simptomele includ amețeală, vedere dublă și tulburări de vorbire. O stare de rău și o durere de stomac sunt, de asemenea, posibile simptome.



Giftinformationscentralen

SWEDISH POISONS INFORMATION CENTRE