

У этих трех видов грибов на шляпках имеются пятна. Но эти пятна могут легко отделяться и частично или полностью отсутствовать.



### Мухомор красный

*Amanita muscaria*

Шляпка 10-25 см. Цвет шляпки может меняться от ярко-красного до бледно-оранжевого. Пятна белые. На ножке хорошо заметное кольцо, в нижней части ножки утолщение. Растут и в лиственных, и в хвойных лесах.



### Мухомор королевский

*Amanita muscaria var. regalis*

Цвет шляпки от коричневого до желто-коричневого, 10-20 см, с бело-желтыми пятнами. На ножке хорошо заметно кольцо, в нижней части ножки утолщение. Растет в хвойных лесах.



### Мухомор пантерный

*Amanita pantherina*

Шляпка 5-12 см, в разных оттенках коричневого цвета. Пятна белые, кольцо на ножке иногда отсутствует. В нижней части ножки утолщение. Обычно растет в лиственных лесах и парках, но иногда встречается и в хвойных лесах.

#### Действие яда и симптомы

Все эти грибы содержат яд, поражающий нервную систему. Могут возникать судороги, головокружение, спутанность сознания, беспокойство, нарушения сознания. Иногда также тошнота и рвота.

#### Хотите узнать больше о грибах?

- Запишитесь на ознакомительные курсы или экскурсии, которые проводятся специальными учебными организациями и объединениями.
- Подробнее об этом можно почитать на сайтах:  
[www.svampkonsulent.se](http://www.svampkonsulent.se)  
[www.svampguiden.com](http://www.svampguiden.com)



Эта брошюра подготовлена Центром информации о ядах в сотрудничестве с Национальной ассоциацией экспертов по грибам.



Фото и компоновка: Михаил Куржков

# Самые опасные ядовитые грибы в Швеции!



## СТОП!

- Не собирайте грибы, похожие на те, которые показаны в этой брошюре!
- Берите только те грибы, которые хорошо знаете!
- Не пробуйте их на вкус! Ядовитые грибы тоже могут быть вкусными!
- Чистить грибы должны только взрослые, хорошо разбирающиеся в них!
- Купите современную книгу о грибах!



В случае реального отравления и для получения информации о ядах звоните по телефону 112 - круглосуточно.  
В менее срочных случаях звоните по телефону 010-456 6700.  
[www.gic.se](http://www.gic.se)



## Мухомор белый (вонючий)

*Amanita virosa*

Весь гриб белый. Шляпка 5-12 см. Обычно на ножке кольцо, но иногда оно отсутствует. Совсем молодой гриб похож на яйцо. На нижней части ножки, которая часто уходит глубоко в мох, имеется утолщение. Белый мухомор растет во мшистых хвойных и буковых лесах.

### Действие яда и симптомы

Его яд поражает печень. Признаки отравления - водянистая диарея, тошнота и рвота, которая начинается через несколько часов после употребления грибов в пищу. Велик риск тяжелого поражения печени. Отравление этим грибом может привести к смерти.

## Бледная поганка

*Amanita phalloides*



Шляпка 5-12 см. Окраска может варьироваться от почти белой до зеленоватой, или серой, или светло-коричневых оттенков. Пластинки белые. Обычно на ножке тонкое кольцо, но иногда оно отсутствует. В нижней части ножки утолщение. Бледная поганка растет в лиственных лесах, смешанных лесах (т. е. в которых лиственные и хвойные деревья растут вместе) и на травянистых участках с буком, дубом и орешником.

### Действие яда и симптомы

Содержит тот же яд, что и белый мухомор. Симптомы отравления те же, и гриб столь же опасен – см. выше!



## Паутинник красноватый

*Cortinarius rubellus* (*C. speciosissimus*)

Шляпка 4-8 см. Окраска всего гриба - от красновато-коричневой до желто-коричневой. Шляпка часто заостренная, но не всегда. Растет во мшистых хвойных и буковых лесах. Существует очень похожий вид, который содержит тот же яд: паутинник оранжево-коричневый, или желтый (*C. orellanus*). Растет в лиственных лесах с буком, дубом и орешником.

### Действие яда и симптомы

Его яд поражает почки, которые могут быть полностью разрушены. Признаки интоксикации могут проявляться лишь через несколько дней. Это может быть сильная жажда, боли в мышцах, увеличение или уменьшение диуреза. При таком отравлении может потребоваться длительный диализ или даже пересадка почки.

## Строчок обыкновенный

*Gyromitra esculenta*



Строчок обыкновенный относится совсем к другой группе грибов. Шляпка 4-12 см, коричневая, округлая и морщинистая.

Цвет ножки может быть разным: бледно-серым, коричневым или светло-фиолетовых оттенков.

Строчок обыкновенный растет весной, с апреля до цветения берез, часто вдоль лесных дорог, на вырубках и на лесных полянах.

### Действие яда и симптомы

Его яд поражает нервную систему, а также может поражать клетки крови и печень. Признаки отравления - головокружение, двоение в глазах и невнятная речь. Может также возникать тошнота и боль в животе.