

Svédország legmérgezőbb gombái!



- Ne szedjen a jelen brosúrában található fajokhoz akár kis mértékben is hasonlító gombákat!
- Kizárólag olyan gombát szedjen, amelyet felismer!
- Ne kóstolja meg ezeket! A mérgező gombák is ízletesek!
- A gombák tisztításának feladatát a gombákat jól ismerő felnőttek végezzék!
- Szerezzen be egy korszerű gombaismertető könyvet!



Légyölő galóca

Amanita muscaria

Kalap: 10 – 25 cm. A kalap színe élénk pirostól fakó narancssárgás pirosig terjed. A pöttyök fehérek. A tönkön nagy gyűrű található, a tönk alsó része pedig duzzadt. Lombos és tűlevelű erdőkben terem.



Barna galóca

Amanita muscaria var. regalis

A barnától sárgás barnáig terjedő kalap 10 – 20 cm átmérőjű, és sárgás fehér pöttyökkel rendelkezik. A tönkön jellegzetes gyűrű található, a tönk alsó része pedig duzzadt. Tűlevelű erdőkben terem.



Párducgalóca

Amanita pantherina

A kalap 5 – 12 cm átmérőjű, és barnás árnyalatokban pompázik. A pöttyök fehér színűek, és a tönkön nem mindig látható gyűrű. A tönk alsó része duzzadt. Lombos erdőkben és parkokban terem, illetve ritkán tűlevelű erdőkben.

Ez a három faj pöttyös kalappal rendelkezik. Azonban a pöttyök könnyedén lehullhatnak, így előfordulhat, hogy csak néhány marad vagy az összes lehull.

A mérgezés hatásai és tünetei

A brosúrában szereplő összes gomba tartalmaz olyan mérget, amely zavart okoz az idegrendszerben. A lehetséges tünetek között megemlíthető a szédülés, zavarodottság, izgatottság, csökkent tudatállapot és a görcsök megjelenése. Néha ezeket rosszullet és hányás kísérheti.

Hogyan tudhat meg többet a gombákról?

- Iratkozzon fel egy gombaismereti képzésre vagy kirándulásra. Képzések és kirándulások tekintetében érdemes megkeresni az oktatási egyesületeket és a gombaszövetségeket.
- Hasznos webhelyek: www.svampkonsulent.se • www.svampguiden.com

112

Mérgezés gyanús sürgős esetekben hívja a 112-es telefonszámot (24-órás ügyelet), és kérjen mérgezésre vonatkozó információt. Kevésbé sürgős esetekben hívja a 010-456 67 00-es telefonszámot • www.gic.se



Hegyeskalapú galóca

Amanita virosa

A gomba teljes egészében fehér. A kalap 5 – 12 cm átmérőjű. A tönkön általában feltűnik egy gyűrű, ám nem minden esetben. Rendkívül fiatal korban tojásalakúak. A tönk alsó, duzzadt része mélyen az avarban található. A hegyeskalapú galóca mohás fenyőerdőkben és bükkösökben terem.

A mérgezés hatásai és tünetei

A mérge májkárosodást okoz. A tünetek között megemlíthető a vizes hasmenés, rosszullet és hányás, amely órákkal a gomba elfogyasztását követően jelentkeznek. Súlyos májkárosodást okozhat. A mérgezés végzetes kimenetelű is lehet.



Gyilkos galóca

Amanita phalloides

A kalap 5 – 12 cm átmérőjű. A kalap színe rendkívül változó, lehet szinte teljesen fehér, de tartalmazhat zöld vagy szürke és világosbarna árnyalatokat is. A lemezek fehérek. A tönkön egy vékony gyűrű látható, ám nem minden esetben. A tönk alsó része duzzadt. A gyilkos galóca lombos és vegyes erdőkben (együttesen lombhullató és tűlevelű fáknek helyet adó erdőkben), illetve nyírfás, tölgyes és mogyorófás dombokon terem.

A mérgezés hatásai és tünetei

Ugyanazt a mérget tartalmazza, mint a hegyeskalapú galóca. A tünetek megegyeznek, és ugyanúgy halálos – lásd feljebb!



Narancsvörös pókhálógomba

Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)

A kalap 4 – 8 cm átmérőjű. A gomba egészének a színe pirosas barnától sárgás barnáig terjed. A kalap általában kúp alakú, ám nem minden esetben. Mohás fenyőerdőkben és bükkösökben terem. A mérges pókhálógomba (*C. orellanus*) hasonló faj, amely ugyanazt a mérget tartalmazza. Tölgynek, bükknek és mogyorófának otthont adó lombos erdőkben terem.

A mérgezés hatásai és tünetei

A mérge vesekárosodást okoz, és teljes mértékben tönkretelheti a veséket. A mérgezés tünetei csupán napokkal a gombafogyasztást követően jelentkeznek. A tünetek között megemlíthető az émelygés, hányás, szomjúság, izomfájdalom, megnövekedett vagy lecsökkent mennyiségű vizelet. A mérgezés hosszan tartó dialízis kezelést vagy egyes esetekben akár veseátültetést tehet szükségessé.



Redős papsapkagomba

Gyromitra esculenta

A redős papsapkagomba a gombák teljesen eltérő csoportjába tartozik. A kalap 4 – 12 cm átmérőjű, barna színű, és agyvelőszerű alakot vesz fel. A tönk színe lehet világosszürke, barna vagy sápadt lila árnyalatú. A redős papsapkagomba tavasztól, áprilistól a nyírfa lombhullásáig terem, előfordulási helye általában erdei utak vagy gyökerestől kitépett fatuskók környéke, illetve vágással irtott tisztások.

A mérgezés hatásai és tünetei

A mérge zavart okoz az idegrendszerben, továbbá károsíthatja a vesejeteiket és a májat. A tünetek között megemlíthető a szédülés, kettős látás és egybefolyó beszéd. Lehetséges tünet lehet továbbá a rosszullet és gyomorfájdalom.



Giftinformationscentralen

SWEDISH POISONS INFORMATION CENTRE